Control de cásida

ESTA APLICACIÓN ES CLAVE

1ª aplicación

¿Cuándo?

2 adultos/planta
o 1 huevo + larva/hoja
o 1er huevo*

- *Lo que suceda antes*
- *No retrasarse*

**No autorizado en producción integrada*

¿Con qué?

Esfenvalerato + Cipermetrina

A dosis máximas de registro. El objetivo es eliminar el mayor número de adultos antes de que hagan las puestas.

2ª aplicación

¿Cuándo?

14 días después de la primera aplicación

- *No retrasarse*

El objetivo es eliminar los nuevos adultos antes de que hagan las puestas.

¿Con qué?

¿Hay larvas?

- **No** → *Esfenvalerato + Cipermetrina*
- **Si**
  - **Pequeñas** → *Esfenvalerato + Lambda Cihalotrin*
  - **Grandes** → *Mospilan (Acetamiprid)*

3ª aplicación

¿Cuándo?

Con primeras larvas grandes

El objetivo es eliminar las larvas que hayan sobrevivido a las dos aplicaciones anteriores.

¿Con qué?

¿Se aplicó Acetamiprid en 2ª aplicación?

- **No** → *Mospilan (Acetamiprid)*
- **Si** → *No tratar u Otros***

***Después de una aplicación con Acetamiprid no debe ser necesaria otra aplicación, en caso de ser necesaria se debe tener en cuenta que para adultos es mejor Esfenvalerato y para larvas es mejor Lambda Cihalotrin.*

La introducción de Esfenvalerato permite aumentar las eficacias sobre adultos

Con la nueva estrategia se puede dar el caso de que después de las dos primeras aplicaciones aún se disponga de al menos una aplicación con todos los productos registrados

Lambda Cihalotrin: usar producto con las dosis de aplicación autorizada ***más altas.***

Es importante insistir en la importancia de no retrasar las primeras aplicaciones pues el éxito de la estrategia es inversamente proporcional al número de huevos que se establezcan en el cultivo.

AIMCRA

Agroteo por y para los remolacheros